

【異なるワクチンの接種間隔】

R2.10.1 より改訂

ワクチンの種類により、接種間隔が異なります。

医師が特に必要と認めた場合は、2種類以上の予防接種を同時に接種することができます。

同時接種を希望される場合は、接種する医師にご相談ください。

同一ワクチンの場合は、
そのワクチンごとの接種
間隔に従ってください。



注射生ワクチン

定期

BCG、麻しん、風しん、麻しん風しん混合(MR)、水痘(みずぼうそう)

任意

おたふくかぜ

27日以上

空ける

間隔
制限なし

間隔
制限なし

注射
生ワクチン

経口ワクチンまたは経鼻生ワクチン
不活化ワクチン

経口または経鼻生ワクチン

定期

ロタウイルス

任意

インフルエンザ

不活化ワクチン

定期

B型肝炎、Hib 感染症、小児の肺炎球菌感染症(15・20価)、5種混合(DPT-IPV-Hib)、4種混合(DPT-IPV)、3種混合(DPT)、2種混合(DT)、ポリオ、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症

任意

インフルエンザ

間隔
制限なし

注射
生ワクチン

経口ワクチンまたは
経鼻生ワクチン

不活化ワクチン